



The effect of computer-assisted Cognitive Rehabilitation (CR) on improving of executive functions of students with attention deficit/hyperactivity disorder

Masoumeh Soltani Pour¹, Akram Parand ^{2*}, Peyman hasani Abharian³, Saeed Sharif Yazdi⁴

¹ M.A of cognitive science of institute cognitive science studies, Tehran, Iran.

² Postdoctoral of child psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.

³ Assistant Professor of Department of cognitive Rehabilitation, institute cognitive science studies, Tehran, Iran.

⁴ M.A of psychology, institute for ethics and education, Qom, Iran.

Citation: soltani pour M, parand A, hasani abharian p, sharif yazdi S. The effect of computer-assisted Cognitive Rehabilitation (CR) on improving of executive functions of students with attention deficit/hyperactivity disorder. **Journal of Cognitive Psychology.** 2021; 9(2): 31-43 [Persian].

Abstract

the children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in executive functions such as kinds of attention, response inhibition and response rate cope with problems which need therapeutic and educational plans to improve. From this kind of methods, cognitive rehabilitation is a new approach, which its effectiveness has studied in various cases. The aim of this study is to find out the effect of Computer- assisted cognitive rehabilitation on improving of executive function of students with attention deficit/hyperactivity disorder. This study is a kind of quasi-experimental design with pre-test / post-test and control groups. 30 students come down with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) selected by the available sampling method and base on criteria for entering of referrals to medical centers. 15 students were in experimental groups and others in control group. Experimental group have received training and computer-assisted Cognitive Rehabilitation for 15 Sessions. the integrated visual and auditory (IVA) continuous performance test, raven's progressive matrices test for children 5 to 9 years, SNAP-IV rating scale the Swanson questionnaire and Captain's Log Cognitive Rehabilitation software. Data has analyzed by analyze of covariance method. the results of this study revealed that improving executive functions, response inhibition variables, sustain attention, self-centered attention and selective attention were caused by Cognitive Rehabilitation by computer game ($P=0.05$). But, significant Improvement was not observed in two variables, response rate and divided attention. ($P=0.05$). Ognitive Rehabilitation by Captain'sLog computer game affected on improving of executive functions of students with attention deficit/hyperactivity disorder so if the children with disorder being train under Cognitive computer software, executive functions of them will improve on response inhibition components, self-centered attention, selective attention and sustain attention.

Key words

Executive functions, Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), computer-assisted Cognitive Rehabilitation.

تأثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر بھبود کارکردهای اجرایی دانشآموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش-فعالی

معصومه سلطانی پور^۱، اکرم پرنده^۲، پیمان حسنی ابهریان^۳، سعید شریف یزدی^۴

۱. کارشناسی ارشد، گروه ذهن، مغز و تربیت، پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران.

۲. (نویسنده مسئول) فوق دکتری روانشناسی و آموزش کودکان با نیاز ویژه، تهران، ایران.

۳. استادیار گروه توانبخشی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران.

۴. کارشناسی ارشد، روان شناسی، موسسه اخلاق و تربیت قم، ایران.

چکیده

کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش-فعالی در کارکردهای اجرایی همچون انواع توجه، بازداری پاسخ و سرعت پاسخدهی با مشکلاتی مواجه هستند که به منظور بھبود آن به برنامه های آموزشی و درمانی نیاز دارند. از میان روش‌هایی که بدین منظور طراحی شده‌اند، توانبخشی شناختی روش نوینی است که اثربخشی آن در مطالعات مختلف بررسی شده است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر بھبود کارکردهای اجرایی دانشآموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش-فعالی است. طرح پژوهش از نوع شبیه‌آزمایشی با پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل است. نمونه پژوهش شامل ۳۰ دانشآموز دارای اختلال نارسایی توجه/بیش-فعالی بوده است که بصورت دردسترس و بر اساس ملاک‌های ورود از بین مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی انتخاب شدند. از این تعداد ۱۵ نفر در گروه آزمایشی و ۱۵ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت ۱۵ جلسه آموزش و توانبخشی-شناختی مبتنی بر رایانه دریافت نمودند. ابزارهای پژوهش عبارتنداز: آزمون عملکرد پیوسته دیداری-شنبیداری (IVA)، آزمون هوش ماتریس‌های پیش‌رونده ریون برای کودکان ۵ تا ۹ سال، پرسشنامه مقیاس رتبه‌بندی سوانسون (SNAP-IV)، نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاغ. داده‌های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که توانبخشی شناختی به وسیله بازی رایانه‌ای موجب بھبودی کارکردهای اجرایی، متغیرهای بازداری پاسخ، توجه مداوم، توجه متمرکز و توجه انتخابی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش-فعالی شده است. ولی در دو متغیر سرعت پاسخدهی و توجه تقسیم شده، تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

تاریخ دریافت

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

تاریخ پذیرش نهایی

۱۴۰۰/۰۵/۲۴

واژگان کلیدی

کارکردهای اجرایی، اختلال نارسایی توجه/بیش-فعالی، توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه.

این مقاله برگرفته از پیمان نامه کارشناسی ارشد نوینه اول می‌باشد.

مقدمه

سوء مصرف مواد، افسردگی و اضطراب قرار خواهند گرفت (بیدرمن^۸، ۲۰۰۵، رو سیتر^۹، ۱۹۹۵؛ به نقل از بخش ایش، ۱۳۹۳). تحقیقات حاکی از آن است که آموزش و رشد کارکردهای اجرایی در گسترش توانمندی‌های اجتماعی، توانایی‌های تحصیلی و آموزشگاهی نقش اساسی دارد، به ویژه این که هرگونه نقص در رشد این کارکردها می‌تواند موجب اختلال نارسایی توجه و بیشفعالی یا اختلال در برناهای ریزی برای شروع و اتمام تکلیف، به یادسپاری تکلیف، اختلال حافظه و اختلال یادگیری شود (عابدی، ۱۳۸۹).

درمان‌هایی که تا کنون برای این اختلال بکار برده شده است عبارتند از: دارودرمانی، رفتاردرمانی و درمان شناختی. در درمان دارویی، علیرغم برخی بهبود‌های حاصل از این روش، نقص‌های شناختی و نوروپیولوژیکی باقی می‌مانند (هکتمن^{۱۰} و همکاران، ۲۰۰۴، لوبار^{۱۱}، ۲۰۰۳؛ به نقل از نوکنی، ۱۳۸۹). عوارضی مانند بی‌اشتهاایی، اختلال در خواب، تیک‌های صوتی و حرکتی و کندی وقت رشد ناشی از مصرف داروها نیز توسط پژوهش‌هایی بررسی و تایید شده‌اند. عدم تمايل والدین به مصرف دارو و همچنین تاثیر کوتاه مدت از دیگر معایب رویکرد دارودرمانی است (هالیجن، ۲۰۰۳، ترجمه سید محمدی؛ به نقل از اعظمی، ۱۳۹۱).

رویکرد درمانی دیگر، رفتاردرمانی است که از روش‌ها و فنون روان‌شناسی آرمایشی برای کمک به رفع مشکلات سازگاری افراد در موقعیت‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی استفاده می‌کند (سیف، ۱۳۹۵). در درمان اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی، این رویکرد شامل ارائه تمرين به کودک و والدین اوست که انجام تمرين‌های مداوم برای آنها دشواری‌هایی دارد. از معایب این روش دشواری و زمان‌بر بودن است.

روش دیگر، شناخت درمانی است. رویکرد اصلی در درمان شناختی^{۱۲}، رویکرد بازتوانی است. این رویکرد با هدف تقویت و بازپروری اجزای شناختی و بهبود عملکردهای

اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی^۱ یکی از مشکلاتی است که شیوع آن در بین کودکان سنین مدرسه رو به افزایش است. بر اساس پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی^۲، اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی، اختلالی عصبی-تحولی است که بر روی کارکردهای مختلف افراد هم در کودکی و هم در بزرگ‌سالی تاثیرگذار است. افراد مبتلا به این اختلال اغلب در نگهداری توجه، کارکردهای اجرایی^۳ و حافظه فعال^۴ مشکل دارند (انجمن روانپژوهشکی آمریکا^۵، ۲۰۱۳). کارکردهای اجرایی به مجموعه‌ای از کارکردهای شناختی اشاره دارد که در یک بافت جدید به همراه پاسخ‌های متناسب و متناقض، فرد را به تعیین رفتار معطوف به هدف قادر می‌سازد و شامل حیطه‌های شناختی است که بسیار مرتبط با کارکردهای تحصیلی، اجتماعی و فعالیت‌های روزانه است. از دیدگاه نوروپایکولوژی، کارکردهای اجرایی جزو اعمالی هستند که بیماران چهار آسیب‌های لوب فرونلتال به خوبی قادر به انجام آنها نیستند. از دیدگاه عصب شناختی این اصطلاح مرتبط با شبکه گستردگی از کارکردهای قشر پیشانی و شامل تعداد زیادی از فرآیندهای شناختی و فراشناختی همچون خودتنظیمی رفتار و رشد مهارت‌های شناختی و اجتماعی است (زلazo، ۲۰۰۲؛ به نقل از کرمشاهی و همکاران، ۱۳۹۳). نقص در کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی بارها توسط محققین مورد تایید قرار گرفته است (بارکلی، ۱۹۹۸). برخی از مطالعات اشاره کرده‌اند که نارسایی‌های عصب شناختی همچون نقص در کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان می‌توانند در سنین بالاتر نیز پایدار بمانند. اغلب کودکان مبتلا، در انجام تکالیف مدرسه و رفتارهای اجتماعی مشکل جدی دارند (ملترر^۶، ۲۰۰۷). لذا در صورت تشخیص نادرست و دیرهنگام، افراد مبتلا به این اختلال در معرض خطر ضعف عملکرد تحصیلی، شکستهای شغلی، پرخاشگری، مشکل در روابط بین فردی و دیگر اختلالات روان‌شناختی مانند

⁷ Meltzer

⁸ Bideaman

⁹ Rossiter

¹⁰ Hechtman

¹¹ Lobar

¹² Cognitive Therapy

¹ Attention Deficit Hyperactivity Disorder(ADHD)

² Diagnostic And Statistical Manual Disorder (DSM)

³ Executive Functions

⁴ Working Memory

⁵ American Psychiatric Association (APA)

⁶ Zelazo

مزایا اغلب با استفاده از رویکردهای غیر رایانه‌ای برای پرورش شناختی، بسیار چالش برانگیز هستند.

تأثیر بازی رایانه‌ای کاپیتان لاغ^۷ در کشورهای مختلف بر روی انواع اختلالات، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهشی توسط لمپیت و همکاران^۸ (۲۰۱۴)، تاثیر این بازی شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی افراد عادی بزرگسال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که این بازی رایانه‌ای، حافظه، توجه، استدلال و توانایی دیداری- فضایی را در دانشجویان افزایش می‌دهد. رابینر و همکاران^۹ (۲۰۱۰)، نیز در پژوهشی بر روی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی، تاثیر بازی شناختی کاپیتان لاغ را بر کاهش نشانگان ADHD نشان دادند. همچنین تینوس و همکاران^{۱۰} (۲۰۰۱) تاثیر بازی شناختی کاپیتان لاغ و بیوفیدیک را بر بهبود معنادار توجه و کنترل پاسخ، در بزرگسالان با آسیب مغزی و اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی را نشان دادند. سها و همکاران^{۱۱} (۲۰۱۵)، نیز در مطالعه موردي بر روی کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی، تاثیر بازی شناختی کاپیتان لاغ را بر بهبود سرعت پردازش دیداری - حرکتی، توجه پایدار و حافظه فعال نشان دادند. هال و همکاران^{۱۲} (۱۹۹۲)، تاثیر بازتوانی شناختی با استفاده از بازی رایانه‌ای کاپیتان لاغ به همراه دارودرمانی بر روی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج پژوهش آنها نشان داد گروهی که دارودرمانی به همراه بازتوانی شناختی رایانه‌ای دریافت کرده بودند، در مقایسه با گروهی که دارودرمانی به همراه رفتاردرمانی داشتند، در تکانش‌گری بهبود نشان دادند. کلینگبرگ و همکاران^{۱۳} (۲۰۰۲)، تاثیر بازی شناختی کاپیتان لاغ را در بهبود حافظه کاری و رفتارهای تکانشی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی نشان داده‌اند. کامرون و همکاران^{۱۴} (۱۹۸۰)، نیز در مطالعه‌ای با استفاده از بازی شناختی کاپیتان لاغ بهبود کلی را در رفتارهای کلامی و تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/

مشخص، با بکارگیری تمرین‌ها و تکاليف شناختی هدفمند انجام می‌گيرد (زنالی و همکاران، ۱۳۹۵). امروزه بر مبنای پيشرفت دانش در زمينه انعطاف‌پذيری و خودترميمی مغز^۱ انسان، شواهد نيرومندی وجود دارد که نشان می‌دهد كنش‌های عصب شناختی را می‌توان به کمک آموزش‌های شناختی، به گونه‌ای بادوام بهبود بخشید (اکانل، ۲۰۰۷، نقل از شهرابی، ۱۳۹۱). اين توانايی مغز انسان، دانش جديدي تحت عنوان بازتوانی عصبي^۲ را توسعه داد. به اين ترتيب بازتوانی شناختی^۳ به عنوان يك روش درمانی موثر در بهبود کارکردهای شناختی در طيف وسیعی از اختلالات روانی و عصب شناختی مطرح شده است.

تونبخشی شناختی مبتنی بر رایانه رویکرد جدیدی است که از امتياز علاقه کودکان به بازی‌های رایانه‌ای و همچنین قابلیت را يانه‌ها در انجام تمرین‌های دقیق و منظم و هدفمند، بهره گرفته است. تونبخشی شناختی مبتنی بر را يانه به آموزش‌هایي اطلاق می‌شود که مبتنی بر یافته‌های علوم‌شناختی و در قالب بازی‌های رایانه‌ای، در تلاش برای بهبود و ارتقای عملکردهای شناختی هستند. اين آموزش‌ها بر اساس اصل انعطاف‌پذيری عصبي^۴ (نوروپلاستيسيتی) است (تارول، ۲۰۰۹؛ به نقل از بيرامى و همکاران، ۱۳۹۵). نوروپلاستيسيتی به سیستم اعصاب مرکزی اجازه می‌دهد که مهارت‌های جدید یاد بگيرد، اطلاعات را به یاد بیاورد و شبکه‌های نورونی در پاسخ‌دهی به محرك‌های بیرونی، دوباره سازماندهی شوند (جانستون^۵ و همکاران، ۲۰۰۸). تونبخشی شناختی مبتنی بر رایانه با بکارگیری نوع ویژه‌ای از بازی‌های رایانه‌ای با هدف تقویت و پرورش کارکردهای شناختی ناقص در بیماران مبتلا به انواع اختلالات، گسترش یافته است (بایکیک^۶ و همکاران، ۲۰۱۵). شماری از فواید استفاده از رایانه در تونبخشی شناختی عبارتند از: نمره گذاري و ثبت اطلاعات، اندازه گيري زمان‌های پاسخ، ايجاد تمرین‌های شناختی متفاوت و جديد برای آموزش و فعالیت، انجام محاسبات مورد نياز برای اندازه گيري پيشرفت و ارائه بازخورد فوري که اين

⁸ Lampit

⁹ Rabiner

¹⁰ Tinius

¹¹ Saha

¹² Hall

¹³ Klingberg

¹⁴ Cameron

¹ Brain Plasticity

² Neuro Rehabilitation

³ Cognitive rehabilitation

⁴ Neuroplasticity

⁵ Johnston

⁶ Bikic

⁷ Captain's Log

نوع مطالعه آزمایشی، انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس و از بین دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی و دارای سن ۷ تا ۹ سال مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر قم و بر اساس ملاک‌های ورود پژوهش، انتخاب شدند. ملاک‌های ورود عبارتنداز: ۱) کودکان باید در دامنه سنی بین ۷ تا ۹ سال قرار داشته باشند. ۲) با توجه به اطلاعات پرسشنامه مقیاس طبقه‌بندی سوانسون (سوانسون و پلهام، ۱۹۸۰) که توسط والدین کودک تکمیل شده است، افراد باید علایم اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی را دارا باشد. ۳) وضعیت کودک توسط روانپزشک مورد بررسی قرار گرفته و تشخیص بالینی اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی را دریافت کند. ۴) افراد از هوش نرمال برخوردار باشند. تشخیص این معیار بوسیله عملکرد آزمودنی‌ها در آزمون ماتریس‌های پیش‌رونده ریون برای کودکان ۷ تا ۹ سال (ریون، ۱۹۳۸) صورت گرفت، بدین معنی که نمره افراد بین ۸۵ تا ۱۱۵ قرار داشت. ۵) افراد باید فاقد علائم سایر اختلالات دیگر مانند اوتیسم و ناتوانی ذهنی و ... باشند. ۶) افراد باید در آزمون عملکرد پیوسته دیداری-شنبیداری (IVA) (ستدفورد و ترنر، ۱۹۹۴) نمره پایین تر از ۸۵ و بالاتر از ۶۰ در قسمت توجه دیداری یا شنبیداری دریافت کنند. این دامنه نشان‌دهنده وجود اختلال در توجه و تمرکز است. نمره کمتر از ۶۰ نشان‌دهنده آسیب بسیار شدید است که آموزش توانبخشی شناختی برای این کودکان دشوار است.

۲. روش اجرای پژوهش:

متغیر مستقل در این پژوهش توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه است. متغیرهای وابسته عبارتنداز: توجه مدام، توجه متتمرکز، توجه انتخابی، توجه تقسیم شده، سرعت پاسخ‌دهی و بازداری پاسخ. متغیرهای کنترل نیز هوش، سن و شدت اختلال هستند. با بررسی اطلاعات درج شده در پرونده مراجعه کنندگان مرکز روانپزشکی، افراد واحد ملاک‌های ورود به پژوهش انتخاب شده و ضمن معرفی طرح از آنها برای شرکت در پژوهش دعوت بعمل آمد. پس از مراجعه و تایید نهایی افراد از نظر واحد بودن ملاک‌های ورود و تکمیل پرسشنامه، پیش‌آزمون عملکرد پیوسته

بیش‌فعالی نشان دادند. کاتوال و همکاران^۱ (۱۹۹۶)، نیز در یک مطالعه موردی نشان دادند که بهبود معناداری در افزایش مدت زمان ماندن در کلاس درس و انجام تکلیف مشاهده شد. در ایران نیز تاثیر برنامه‌های شناختی را یا نهای مختلفی، بر روی بهبود انواع اختلالات مانند: اختلالات یادگیری، بیش‌فعالی و سایر ناتوانی‌ها مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است (عبدی، حاتمی، پرند و عربانی دانا، ۱۳۹۲؛ قمری گیوی و همکاران، ۱۳۹۱؛ اعظمی و همکاران، ۱۳۹۱) پژوهشی که به تاثیر برنامه شناختی رایانه‌ای کاپیتان لاغ پرداخته باشد، توسط پژوهشگر یافت نشد.

با توجه به لزوم درمان کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی، تقاضا از طرف صاحب‌نظران و والدین کودکان برای روش درمانی مکمل و جایگزین دارودارمانی و رفتاردرمانی وجود دارد. از سوابی دیگر نتایج بدست آمده از برخی تحقیقات مربوط به اثربخشی مداخلات توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه در درمان این اختلال متناقض است. بنابراین ضروری است که تاثیر واقعی برنامه‌های توانبخشی شناختی رایانه‌ای متنوعی که در مراکز توانبخشی شناختی برای بهبود مهارت‌های شناختی افراد بکار می‌رود با روش‌های علمی و دقیق سنجیده شود. لذا پژوهش حاضر بر آن شد تا اثربخشی درمان توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه را در بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی، شامل بازداری پاسخ، انواع توجه و سرعت پاسخ‌دهی در نمونه کودکان ایرانی مورد بررسی قرار دهد.

روش

طرح پژوهش

روش پژوهش شبه‌آزمایشی و با طرح دوگروهی (گروه آزمایشی و گروه کنترل) با پیش‌آزمون-پس‌آزمون بود.

۱. جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان ۷ تا ۹ سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی شهر قم در سال ۱۳۹۶ بود. تعداد ۳۰ نفر به عنوان نمونه بر اساس

^۱ Kotwal

پس از پایان جلسات از کلیه افراد گروههای آزمایشی و کنترل پس آزمون به عمل آمد.

۳. روش تحلیل داده ها:

در پایان داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-23 و به کمک تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۴. ابزار های پژوهش:

الف. آزمون عملکرد پیوسته دیداری - شنیداری (IVA):

آزمون توسط سندفورد و ترنر در سال ۱۹۹۴، و بر مبنای نسخه چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی طراحی شده است. آزمون IVA قادر به تشخیص و تفکیک انواع اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در سنین بالای ۶ سال می باشد. زمان کلی آزمون ۲۰ دقیقه و زمان اجرای آزمون اصلی ۱۳ دقیقه است. محرك های این آزمون شامل ۵۰۰ آیتم از اعداد یک و دو است که به دو شکل دیداری و شنیداری ارایه می شود. تکلیف آزمون شامل پاسخ یا عدم پاسخ به محرك می باشد. هر آیتم فقط ۱/۵ ثانیه طول می کشد؛ بنابراین آزمون به حفظ توجه نیاز دارد. نتایج مطالعات درباره اعتیار و روایی آزمون نشان می دهد که آزمون IVA حساسیت کافی (٪۹۲) و قدرت پیش بینی درست (٪۶۰) را برای تشخیص درست اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در کودکان دارد (مدنی و همکاران، ۱۳۹۲).

ب. آزمون ماتریس های پیش رونده ریون برای کودکان ۵ تا ۹ سال:

آزمون ماتریس های پیش رونده ریون آزمونی غیر کلامی و مستقل از فرهنگ، زبان و تحصیلات رسمی است و به منظور ارزیابی بهره هوشی استفاده می شود که دارای دو فرم کوتاه و بلند است. فرم کوتاه این آزمون برای سنجش هوش کودکان ۵ تا ۹ سال و بزرگسالان کم توان ذهنی طراحی شده است که شامل ۳۶ تصویر هندسی رنگی است و به سه سری دوازده تایی A و AB و B تقسیم می شوند. تصاویر از آسان به دشوار مرتب شده اند. ضربی همبستگی این آزمون با آزمون های استنفورد - بینه و

دیداری- شنیداری IVA به عمل آمد. قرار گرفتن افراد در گروه های آزمایش و کنترل، بر اساس امکان و تمایل یا عدم تمایل ایشان برای شرکت در طرح پژوهشی صورت گرفت. افرادی که تمایل به شرکت در برنامه توانبخشی شناختی رایانه ای نداشتند در گروه کنترل قرار گرفتند و از آنها خواسته شد تا در موعد مقرر برای انجام پس آزمون مراجعه نمایند. پس از قرار گرفتن افراد در گروه های آزمایشی و کنترل، آموزش و توانبخشی شناختی آغاز گردید. در ابتدای آزمایش، افراد از نظر مهارت هایی مانند: کنترل موس، دانستن نام رنگ ها، هماهنگی حرکات دست و چشم متفاوت بودند که مورد آموزش قرار گرفتند. در مرحله انجام تمرین های توانبخشی شناختی، دستورات برای انجام تکالیف هر مرحله توسط پژوهشگر به زبان فارسی برگردانده و به کودکان توضیح و تفہیم شد. در صورت کسب امتیاز لازم برای گذراندن مراحل، تمرین مرحله بعد ارائه گردید و در صورت عدم کسب امتیاز لازم، همان مرحله تکرار شد. مرحله اول برای افراد، با توجه به توانایی و سطوح اختلال آنها متفاوت بود. کودکان با آسیب بیشتر از مراحل ساده تر و کودکان با آسیب کمتر از مراحل دشوارتر شروع به تمرین کردند.

برای تقویت و توانبخشی شناختی در گروه نمونه آزمایشی، از تمرین های قسمت مهارت های تحولی توجه^۱ بازی شناختی کاپیتان لاغ استفاده شده است. تمرین های این بخش به تقویت توجه می پردازد و همزمان بازداری پاسخ را بهبود می بخشد. همچنین بدليل قابلیت ایجاد محدودیت زمانی معین برای پاسخدهی به هر محرك، موجب بهبود سرعت پردازش ذهنی نیز می شود. مراحل پایانی نیز برای کودکان با سطوح مختلف اختلال، متفاوت بود. برخی به مراحل انتهایی رسیدند و برخی نیز تا مراحل بالاتر رفته ولی به مرحله نهایی نرسیدند. تعداد جلسات ارائه مداخله توانبخشی شناختی رایانه ای برای هر فرد دو روز در هفته و در مجموع ۱۵ جلسه و زمان انجام تمرین های شناختی برای هر فرد ۴۵ دقیقه بود. در طول هر جلسه (میان یا پایان جلسه) هر کودک می توانست یک بازی رایانه ای مورد علاقه اش را به عنوان زنگ تغیریح انتخاب و بازی کند. گروه کنترل در این مدت هیچ گونه برنامه ای در یافت نکردند.

^۱ Attention Skills Developmental

این پرسشنامه در بردارنده سوال‌های مربوط به نام و نامخانوادگی، جنسیت، سن کودک، مقطع و پایه تحصیلی، سطح تحصیلات پدر و مادر و شغل پدر و مادر کودک است و به همراه پرسشنامه سوانسون به والدین کودکان ارائه گردید.

۵. نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاغ:

این نرم افزار توسط سنفورد و همکاران (۱۹۸۵) به زبان انگلیسی ساخته شده و برنامه‌ای جامع است که به وسیله‌ی ۵۰ تمرین، مهارت‌های شناختی اساسی را پرورش می‌دهد. تمرین‌ها دارای سه سطح طلا، نقره و الماس و هر سطح دارای ۱۵ مرحله می‌باشد. ساختار سلسله مراتبی، بازخورد مناسب و گزینه‌های کنترل فراوان مانند سرعت، از ویژگی‌های خوب این نرم افزار می‌باشد. این نرم افزار مهارت‌هایی از قبیل: توانایی توجه، حافظه‌ی فعال، حافظه‌ی کوتاه‌مدت، سرعت پردازش ذهنی، بازداری پاسخ، کنترل تکانه، مهارت‌های شنیداری، حل مسئله و استدلال مفهومی، سرعت و کنترل حرکات ظرفی، طبقه‌بندی و توالی دیداری-فضایی را پرورش می‌دهد.

یافته‌ها

داده‌های بدست آمده از آزمون نرم افزاری عملکرد پیوسته دیداری-شنیداری (IVA) و پرسشنامه‌ها، آماده سازی شده و با استفاده از نرم افزار اکسل تعریف، ویرایش، طبقه‌بندی و کدگذاری گردید. پردازش داده‌ها در دو سطح توصیف و تحلیل انجام شد. در سطح توصیف داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی شامل: جنسیت، پایه تحصیلی، شدت و سطح اختلال پرداخته شد.

وکسلر بین ۰/۴۰ تا ۰/۷۶ است (آناستازی، ۱۹۹۰؛ به نقل از شریفی، ۱۳۷۶). ضریب پایایی آزمون ماتریس‌های پیش‌روندۀ ریون در گروه‌های سنی مختلف بین ۰/۴۰ تا ۰/۹۲ گزارش شده است (کاتونز و همکاران^۱، ۲۰۰۵، به نقل از اسماعیلی، ۱۳۹۵).

ج. پرسشنامه مقیاس رتبه‌بندی سوانسون (SNAP-IV):

پرسشنامه مقیاس رتبه‌بندی SNAP-IV، اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی را اندازه‌گیری می‌کند و عموماً توسط دو مرجع (والدین و معلم) تکمیل می‌گردد. این مقیاس ابتدا در سال ۱۹۸۰ توسط سه مولف به نام‌های سوانسون، نولان و پلهام^۲ بازنویسی ملاک‌های تدوین و SNAP با حرف اول اسامی سازندگان آزمون به نام شناخته شد. همزمان با تجدیدنظر در ملاک‌های راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی و تدوین DSM-IV، مقیاس مذکور نیز بازنویسی شد. این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال می‌باشد، ۹ سوال جهت شناسایی نوع غالباً بیشفعال و ۹ سوال برای تشخیص گذاری نوع غالباً بیشفعال و تکاذ شگر اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی طراحی شده است. این مقیاس بر اساس طیف لیکرت و چهارگزینه‌ای به صورت هرگز/بندرت تا همیشه است. این مقیاس دارای اعتبار و روایی مناسب می‌باشد و تو سط صدرالسدات و همکارانش (۱۳۸۵) بر روی دو گروه والدین و معلمان کودکان ۷ تا ۱۲ ساله شهر تهران هنجار شده و روایی ملاکی آن برابر با ۰/۴۸ و ضریب پایایی بازآزمون برابر با ۰/۸۳، ألفای کرونباخ ۰/۹۰ و ضریب دونیمه کردن ۰/۷۶ گزارش نموده‌اند.

د. پرسشنامه دموگرافیک:

جدول ۱. توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس پایه تحصیلی

پایه	مجموع	فراآنی	درصد فراوانی
اول	۱۷	۱۷	۵۷/۸
دوم	۹	۹	۳۱/۱
سوم	۴	۴	۱۱/۱
	۳۰		۱۰۰/۰

^۳ Swanson, Nolan & Pelham

^۱ Cattons

^۲ SNAP Rating Scale

جدول ۲. توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس جنسیت

جنسیت	مجموع	فراوانی	درصد فراوانی
پسر	۳۰	۲۰	۶۶/۷
دختر	۱۰	۱۰	۳۳/۳
	۳۰		۱۰۰/۰

جدول ۳. توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس شدت و سطح اختلال

سطح اختلال	مجموع	فراوانی	درصد فراوانی
ضعیف	۱۱	۱۱	۳۷/۸
متوسط	۱۰	۱۰	۳۵/۶
نسبتاً شدید	۹	۹	۲۶/۷
	۳۰		۱۰۰/۰

برای آزمون نرمال بودن فرضیه‌های پژوهش از آزمون کلموگروف اسمایرنوف استفاده شد:

جدول ۴. آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی پژوهش

متغیر	آماره کلموگروف- اسمایرنوف	مقدار [*] p
توجه مداوم دیداری	۱/۱۱۲	۰/۱۶۸
توجه مداوم شنیداری	۲/۲۵	۰/۵۲۱
توجه تقسیم شده دیداری	۰/۱۸۷	۰/۱۱۵
توجه تقسیم شده شنیداری	۰/۲۹۸	۰/۱۴۸
توجه متمرکر دیداری	۰/۲۱۴	۰/۸۴۱
توجه متمرکر شنیداری	۱/۲۶۱	۰/۱۸۶
توجه انتخابی دیداری	۰/۱۸۷	۰/۱۱۹
توجه انتخابی شنیداری	۰/۶۳۴	۰/۲۱۱
بازداری پاسخ دیداری	۱/۳۸۴	۰/۲۰۱
بازداری پاسخ شنیداری	۶/۳۱۱	۰/۶۳۲
سرعت پردازش دیداری	۱/۲۰۵	۰/۸۱۵
سرعت پردازش شنیداری	۲/۳۲۲	۰/۸۴۷

مقدار **P** مربوط به آزمون کلموگروف اسمیرنوف در نمرات متغیرهای تحقیق بیشتر از ۰/۰۵ می‌باشد. بنابراین نتیجه می‌شود که توزیع متغیرهای تحقیق نرمال است.

جدول ۵. مفروضه‌های آزمون کوواریانس

متغیرها	ازمون لوین	یکسانی شبیخ خط رگرسیون	Sig	F
	F		Sig	F
بازداری پاسخ	۱/۵۷۸	۰/۵۸۸	۰/۳۱۲	۰/۲۱۴
سرعت پردازش و پاسخدهی	۱/۲۶۲	۰/۰۸۷	۱/۳۱۸	۰/۲۲۸
توجه مداوم	۱/۲۲۹	۰/۲۳۸	۱/۳۹۲	۰/۳۱۲
توجه تقسیم شده	۲/۰۲۱	۰/۸۴۱	۰/۳۱۲	۰/۰۶۶
توجه متتمرکز	۱/۳۹۷	۰/۱۱۸	۰/۳۶۴	۰/۳۱۲
توجه انتخابی	۰/۳۱۴	۰/۱۷۵	۰/۶۳۱	۰/۳۲۵
کارکردهای اجرایی	۰/۳۸۵	۰/۱۶۵	۱/۰۱۱	۰/۳۳۶

یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که استفاده از توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی تاثیر دارد. برای آزمون فرضیه از آزمون کوواریانس استفاده شده است.

نتایج یافته‌های جدول بالا نشان می‌دهد فرض یکسانی واریانس‌ها در آزمون لوین و یکسانی شبیخ خط رگرسیون تایید شده است و با توجه به نرمال بودن توزیع داده‌ها، مفروضات آزمون کوواریانس برقرار می‌باشد.

جدول ۶. آماره‌های توصیفی کارکردهای اجرایی در گروه‌های آزمایشی و گواه

متغیر	گروه بندی	میانگین	انحراف معیار
آزمایش	آزمایش	۱۰۹۳/۶۶۶۷	۵۳/۰۲۳۸۰
گواه	گواه	۱۱۳۹/۹۳۳۳	۳۶/۵۳۶۶۱
آزمایش	آزمایش	۱۲۱۶/۰۰۰۰	۳۲/۶۸۰۲۷
گواه	گواه	۱۱۵۸/۳۳۳۳	۵۵/۸۸۵۹۴

استفاده از توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه باعث افزایش میانگین کارکردهای اجرایی شده است.

نتایج جدول بالا نشان می‌دهد میانگین کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش افزایش پیدا کرده است و در مجموع

جدول ۷. نتیجه آزمون کوواریانس برای متغیر کارکردهای اجرایی

منبع تغییرات	مجموع مجذورات درجه آزادی	میانگین F	سطح مقادیر ضرب	معناداری ایتا
همپراش	۲۶۴۲۴/۱۲۵	۲۶۴۲۴/۱۲۵	۴/۵۰۳	۰/۱۰۱
اثر توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه	۶۸۹۶۵/۹۵۷	۱۱/۷۵۲	۰/۰۰۱	۰/۲۲۷

اجرایی و انواع توجه (انتخابی، پایدار و متتمرکز) و بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بشمار آورد. همسو با یافته های پیشین فرض شد که فعال کردن مکرر و تحريك مداوم مناطق درگیر باعث تغيير در ظرفيت شناختي شده است که اين خود بر مبناي اديبيات پژوهش، به نظر نشان دهنده تغييرات زيربنائي در فعالیت نوروني مغز است (ماتيري و ماپو، ۱۹۹۶). در تبيين اثربخشی بازتواني شناختي رایانه‌اي بر بهبود کارکردهای اجرایی و مولفه‌های بازداری پاسخ و انواع توجه (انتخابی، مداوم و متتمرکز) می‌توان به اصول انعطاف‌پذيری عصبي (نوروپلاستيسيتی) استناد کرد. از آنجا يك ۱: مغز سازمانی پوياست و ظرفيت بازسازماندهی عصب شناختي وسیعی در طول سالهای زندگی دارد، ۲: پایه تغييرات رفتاري، تغييرات ساختاري در مغز بویژه در رشته‌های دندريتي و سينماپسي هستند، ۳: توانايی‌های شناختي عموماً قابل بهبود هستند، ۴: تحريك ساختارمند تجارب برای مغز با بالا بردن بهبود کارکرد رفتاري نورون‌ها همراه است، ۵: بازسازی کارکردي عموماً شامل بکارگيري نواحي نزديك به آسيب و نواحي مشابه در نيمكره ديگر است، ۶: نتایج رفتاري منعكس كننده تعامل پيچيده فرآيندهای پایين - بالا و بالا - پایين و تأثيرات ميان و درون نيمكره‌اي است (سولبرگ و متيري، ۱۹۸۹). پس در نتیجه، بهبودهای معنادار افراد در کارکردهای اجرایی در اثر تمرین‌های بازتوانی شناختي، ناشی از بهبود انعطاف‌پذيری عصبی مغز آنهاست. اين امر می‌تواند با اندازه‌گيری ميزان سطح سرمي مغز (BDNF)^۱ قبل و بعد از بازتوانی شناختي بررسی شود.

نتایج جدول بالا نشان می‌دهد مقدار F محاسبه شده (۱۱/۷۵۲) در سطح $p \leq 0.05$ معنادار است. به عبارت دیگر نتایج بيان می‌کند که با حذف اثر نمره کارکردهای اجرایی پیش‌آزمون به عنوان متغير همپراش، اثر توانبخشی شناختي مبتنی بر رایانه معنادار بوده است و همچنین مقدار ضرب ایتا نشان می‌دهد، استفاده از توانبخشی شناختي مبتنی بر رایانه می‌تواند ۲۲/۷ درصد از تغييرات کارکردهای اجرایی را تبيين کند.

بحث و نتیجه‌گيري

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير توانبخشی شناختي مبتنی بر رایانه بر بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی انجام شد.

نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که توانبخشی شناختي مبتنی بر رایانه بر کارکردهای اجرایی و مولفه های بازداری پاسخ، انواع توجه شامل توجه انتخابي، مداوم و متتمرکز در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی تأثير معنادار داشته است. نتایج مطالعه حاضر با مطالعه لمپيت و همكاران (۲۰۱۴) همسو است. همچنین نتایج اين مطالعه در بهبود متغير توجه با مطالعه رابينر و همكاران (۲۰۱۰) هم سو بوده و در متغير بازداری پاسخ با پژوهش تينوس و همكاران (۲۰۰۱) همسو است. پژوهش حاضر با مطالعه سها و همكاران (۲۰۱۵) در بهبود متغير توجه همسو است ولی دربهبود متغير سرعت پردازش ناهم سوا است. با توجه به عملکرد افراد در پس آزمون می‌توان از بهبود کارکردهای اجرایی در افراد نمونه اطمینان حاصل کرد و بازتوانی شناختي مبتنی بر رایانه را بعنوان يك رویکرد سودمند در مانی برای بهبود کارکردهای

¹ Brain Driven Neurotrophic Factor

- معنادار نبودن بهبود افراد در متغیر سرعت پردازش و پا سخ دهی شنیداری در گروههای آزمایشی ممکن است بدليل انگلیسی زبان بودن بازی رایانه‌ای و اضافه شدن زمان ترجمه و بازگویی دستورات توسط پژوهشگر به زمان پاسخدهی آزمودنی‌ها و متعاقباً کندی در عملکرد افراد باشد.

- در تبیین عدم معناداری بهبود متغیر توجه تقسیم شده در گروههای آزمایشی، ذکر این نکته ضروری است که پیچیده‌ترین و دشوارترین سطح توجه، نوع تقسیم شده آن است. لذا ممکن است که تکالیف ارائه شده در این پژوهش، باید به مدت بیشتر و با سطح دشواری متنوع تر ارائه می‌گردید تا بهبود معناداری مشاهده شود.

بنابراین توصیه می‌شود در پژوهش‌های آتی این محدودیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می‌باشد. بدین وسیله از تمامی افرادی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند تشکر و قدردانی می‌گردد. همچنین از مرکز خدمات روانپزشکی و روانشناسی دکتر جمشید رحیمی که ابزارهای مطالعه را در اختیار محقق قرار دادند تشکر می‌گردد.

اوریادی و همکارانش (۱۳۹۸) در پژوهشی با پیگیری ۴۵ روزه به بررسی پایدار بودن اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌یار پراخته و عنوان کرده‌اند توانبخشی شناختی باعث ترمیم نورونهای مسئول کارکردهای اجرایی در مغز کودکان می‌شود؛ از این رو چنین تغییراتی نمی‌توانند موقتی باشند و افزون بر این، طبق الگوی بارکلی و مورفی (۲۰۱۰) کارکردهای اجرایی با یکدیگر در تعامل بوده و دارای سلسله مراتب هستند بنابراین انتظار می‌رود بهبود و تقویت در کارکرد بازداری پاسخ به عنوان بالاتری کارکرد در الگوی سلسله مراتبی بارکلی، بر سایر کارکردهای اجرایی تاثیر مثبت بگذارد (عیوضی، یزدان بخش، مرادی، ۱۳۹۷). بنابراین می‌توان از درمان توانبخشی شناختی مبتنی بر بازیهای رایانه‌ای که با ایجاد یک مجموعه جذاب چندین عملکرد شناختی و حواس پنجگانه کودکان را هدف قرار می‌دهد، به عنوان درمان مؤثر و پایدار در بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیشفعالی استفاده کرد.

محدودیت‌ها

- بدليل محدودیت زمانی، مقایسه بین فردی انجام نشد تا پیشرفت افراد نسبت به خودشان بررسی شود. لذا ممکن است در مقایسه بین فردی افراد گروه آزمایشی در متغیرهای سرعت پاسخدهی و توجه تقسیم شده نیز بهبود معناداری را نشان دهند.

منابع

Abedi, A. Malakpoor, M. (1389). Investigation of efficacy of educational-psychological early interventions for improving executive functions and attention of children with neuropsychological learning disabilities. New Educational Approaches. 5, 1, 11, 65-86.

Abdi, A. Arabani Dana, A. Hatami, J. Parand, A. (2013). The Effect of Cognitive Computer Games on Working Memory, Attention and Cognitive flexibility in Students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Exceptional Children. 14(1).

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition. President DiliP. Jeste, M.D (2013).

Azami, S. Moghadas, A. Hemati, F. Ahmadi, A. (1391). Effectiveness of Computer-Assisted Cognitive Remediation (CACR) and Psychostimulant Drugs in Planning Skill of Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Journal of Clinical Psychology Studies. 10, 3. [Persian]

Aivazy, S., Yazdanbakhsh, K., Moradi, A. (2018). The Effectiveness of Computer Cognitive Rehabilitation on Improvement of Executive Function of Response Inhibition in Children with Attention Deficit

- Hyperactivity. *Journal of Neuropsychology*. 4(14): 9-22. Doi: 10.30473/Clpsy.2018.41327.1350. [Persian]
- Barkley, R. A. (1998). Attention-deficit hyperactive disorder: A handbook for diagnosis and treatment (2nd Ed). New York: Guilford.
- Bakhshayesh, A. Mirhoseini, R. (1393). Effectiveness of Play Therapy on the Reduction of Children's Severity Symptoms with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Promotion of Their Academic Performance. *Journal of Ilam University of Medical Science*.22, 6, 1-13. [Persian]
- Beirami, M. Movahedi, Y. Ahmadi, A. (1396). The effectiveness of Cognitive Rehabilitation on the Selective- divided attention and working memory in students with dyslexia & Dyscalculia disabilities. *Journal of Neuropsychology*. Volume 3, Number 2 (consecutive 8). [Persian]
- Bikic, A., Leckman, J.F., Lindschou, J., Christensen, T.O., Dalsgaard, S, (2015).Cognitive Computer Training in Children Wattention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) versus no Intervention: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial,<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Cameron, M.I., Robinson, V.M. (1980) "Effects of Cognitive Training on Academic and On-Task Behavior of Hyperactive Children." *Journal of Abnormal Child Psychology*. Sep; 8(3): 405-19.
- Esmaeeli, F. Nouri, A. Moradi, A. (1395). The Impact of Computerized Attention Oriented Games on Attention Networks and Temperament of Students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. *Journal of Exceptional Children*, 16(1). [Persian]
- Ghamari Givi1, H, Narimani, M, Mahmoodi, H. (1391). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention deficit/hyperactivity. *Journal of Learning Disabilities*, 2(98)115. [Persian]
- Hall, C.W., Kataria, S., (1992) "Effects of Two Treatment Techniques on Delay and Vigilance Tasks with Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD)
- Karamshahi, A.Abedi.A.Yarmohamadian, A. (1393). Development of Executive Function in ADHD Preschool And Primary Schoolchildren Course (5 - 12) Years of Age In Isfahan. *Journal of Advances in Cognitive Sciences*. 16, 1. [Persian]
- Klingberg ,T., Forssberg, H., Westerberg, H., (2002) "Training of Working Memory in Children with ADHD." *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*. 2002 Sep; 24(6): 781-91.
- Kotwal, D.B., Burns, W.J., & Montgomery, D.D. (1996), "Computer-assisted cognitive training for ADHD." *Behavior Modification*. 20. 85-96.
- Lampit,A.,Ebster,C.,Velenzuela,M.,(2014),Mu ltidomain computerized cognitive training program improves performance of bookkeeping tasks : a matched sampling active- controlled trail. *Frontiers In Psychology*, volumn 5, Article 794.
- Madani, A. Heidarinasab, L. Yaghobi, H. Rostami, R. (1393). Surveying Effectiveness of Neuro-feedback in Reduction of Attention and Concentration Deficit Symptoms in ADHD Adults. Biannual Peer review - Shahed University.21, 11. [Persian]
- Meltzer, L. (Ed.). (2007). *Executive Function in Education: From Theory to Practice*. New York: The Gilford Press.
- Nokani, M. (1389). Computer-assisted Cognitive Rehabilitation (CACR) in Reduction Attention Deficit disorder in Children with Attention Deficit /hyperactivity disorder. (Type of Attention Deficit) PhD dissertation, Clinical psychology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. [Persian]

- PashaSharifi, h. (1386). Theory and application of intelligence and personality tests. Tehran. Sokhan.
- Rabiner, D., Murray, D., Skinner, A. (2010), "A Randomized Trial of Two Promising Computer-Based Interventions for Children with Attention Difficulties." *Journal of Abnormal Child Psychology* 38(1): 131-142.
- Sadrosadat, J. Hoshyari, Z. Zamani, Z. Sadrosadat, L. (1385). Determination of Psychometrics Index of SNAP-IV Rating Scale in Parents Execution. *Journal of Rehabilitation*, 8, 3, 31. [Persian]
- Saif, A. Behavior modification and Behavioral Therapy (Theories and Techniques). 6th Edition. Tehran: Duran Publications; 2017, PP: 159-170. [Persian]
- Sohlberg, M.M., Mateer, A. (1989), Introduction to Cognitive Rehabilitation: Theory and Practice, Newyork, NY. USA, Guilford press.
- Sohrabi, F. (2013). Effectiveness of Computer-Assisted Cognitive Remediation (CACR) and psycho stimulant drugs on clinical symptoms of children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). *Contemporary psychology*. 7(2), 51-60.
- Tinius, T., &Tinius, K.A. (2000-2001)"Changes After EEG Biofeedback and Cognitive Retraining in Adults with Mild Traumatic Brain Injury and Attention Deficit Hyperactivity Disorder." *Journal of Neurotherapy*. 4(2)
- Zeinali, A, Souri, A, Ashoori, J. (1395). The Effect of Computer Games on Sustaining Attention and Organisation Ability of Students with Attention Deficit Disorder. *Journal of Advances in Medical and Biomedical Research*, 24, 88-89. [Persian]
- Oryadi P, Hadianfard H, Ghasemi N.(2019) The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation based on Computer Games on Executive Functions of Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder.
- Journal of Cognitive Psychology (JCP).7 (1):121-130. [Persian]